



**Abnormální  
jizvy – více než  
kosmetický  
problém**

**Účinná  
léčba jizev**

# Strataderm®

Gel k léčbě jizev

## Účinná léčba jizev

Gelem **Strataderm®** dosáhnete nejlepší možný výsledek jizvy.

- ✓ Pro léčbu starých i nových jizev.
- ✓ Změkčuje a vyhlazuje jizvy.<sup>2</sup>
- ✓ Zmírňuje svědění, pnutí a bolest v jizvě.<sup>2</sup>
- ✓ Snižuje zarudnutí a tmavé zabarvení.<sup>2</sup>
- ✓ Prevence vzniku abnormálních jizev.<sup>3</sup>
- ✓ Vhodný pro dětskou i citlivou pokožku.
- ✓ Strataderm je bezpečný pro kojence, během těhotenství a kojení.



Zdravotnický prostředek CE

### Jak velké balení gelu Strataderm® potřebuji?

Balení:	Velikost rány / jizvy
Strataderm® 5g	podélná 2–3 cm
Strataderm® 10g	podélná 5–7 cm
Strataderm® 20g	podélná 10–12 cm
Strataderm® 50g	šíroká 6×12 cm
Tuba vystačí na 3 měsíce léčby při aplikaci 2× denně.	

**Literatura:** 1. Mustoe TA et al. *Plast Reconstr Surg* 2002; 110:560–571. 2. Tobola J. *Dermat Estetyczna* 2004;35(6):323–328. 3. Monstrey S et al. *JPRAS* 2014;1–9

**axonia**  
PHARMA

**Výhradní distributor pro ČR a SR:**  
AXONIA, a.s. Bydžovská 185,  
190 14 Praha 9 Česká republika.

**Stratpharma**  
Switzerland

**Výrobce:** Stratpharma AG,  
CH-4051 Basilej, Švýcarsko.

Razítko lékárny, kde můžete gel k léčbě jizev Strataderm zakoupit

Nebo objednejte ještě dnes na [www.eshop.axonia.cz](http://www.eshop.axonia.cz)



## Co je jizva?

Normální jizva se utváří v průběhu 48 hodin po uzavření rány a během následujících 3–12 měsíců vyvrává a bledne. Normální proces hojení ran však ovlivňuje mnoho faktorů, jejichž působením mohou vznikat **jizvy abnormální** (keloidní, hypertrofické, atrofické). Ty bývají doprovázeny následujícími projevy:

- zvětšování jizvy,
- přetrvávající tmavé zbarvení či zarudnutí,
- nepříjemné pocity, svědění, bolest,
- omezení pohyblivosti v oblasti kloubů.

### Hlavní typy abnormálních jizev:<sup>1</sup>



#### Široce roztažená jizva

Plochá, světlá, měkká, nebolestivá.  
Vzniká po chirurgických operacích.



#### Lineární hypertrofická jizva

Červená, vyvýšená, někdy svědí.  
Hojení může trvat až 2 roky.  
Vzniká po chirurgických operacích a úrazech.



#### Široká hypertrofická jizva

Červená, vyvýšená, může svědit.  
Nepřesahuje okraje původní rány.  
Vzniká často po popáleninách.



#### Atrofická jizva

Plochá či vnořená. Malá, často kruhovitého tvaru.  
Vzniká obvykle po akné a neštovicích.



#### Keloidní jizva

Místo vyvýšená. Svědí, přesahuje okraj původní rány.  
Vzniká i několik let po poranění. Bez léčby nemizí.

## Prevence vzniku abnormálních jizev a jejich léčba

Jizvy nelze odstranit úplně. Ve většině případů však lze účinnou léčbou docílit významného **zlepšení vzhledu jizvy a omezení obtěžujících doprovodných projevů.**

## Léčba silikonovým gelem

Silikon má v léčbě jizev primární úlohu.<sup>1</sup> Je snadnou, bezpečnou a vhodnou cestou ke zlepšení vzhledu abnormálních jizev, často bez nutnosti procházet bolestivými invazivními metodami.

## Kdy použít Strataderm®?

Na všechny typy jizev:

- **po chirurgickém zákroku, úrazu a chronických ranách**
- **po popáleninách, pokousání, akné a císařském řezu**
- **způsobené jiným kožním onemocněním**
- **kteřé svědí, pnou, bolí**
- **vystouplé, tvrdé, zarudlé**
- **hypertrofické, keloidní nebo atrofické**

## Jak používat Strataderm®

Jizvu před ošetřením důkladně omyjte a vysušte. Aplikujte **Strataderm®** ve **velmi tenké vrstvě** a nechte řádně zaschnout. Při správném použití zaschne během 3–4 minut. Nanášejte jednou denně, na odkrytá místa dvakrát denně, nebo dle doporučení Vašeho lékaře. Pro dosažení nejlepších výsledků má být **Strataderm®** v nepřetržitém kontaktu s pokožkou (24 hodin denně). Jakmile **Strataderm®** zaschne, můžete ho v případě potřeby překrýt opalovacím přípravkem, tlakovým obvazem, ortézou, apod. **Doporučená doba léčby** je nejméně 60–90 dnů. Léčba větších a starších jizev může trvat déle. Doporučujeme nepřetržitou léčbu až do doby, kdy již nejsou patrné žádné známky zlepšení.

## Klinicky ověřený účinek gelu Strataderm®



Lineární hypertrofická jizva na hrudníku po operačním zákroku. Délka jizvy: 25 mm.  
Stáří jizvy před léčbou: 14 měsíců. Levá jizva zůstala neléčena.  
Pravá jizva po dvouměsíční léčbě gelem **Strataderm®**.



Lineární hypertrofická jizva na hlavě po úrazu. Délka jizvy: 4,5 cm.  
Stáří jizvy před zahájením léčby: 2 týdny. Vlevo jizva před zahájením léčby,  
vpravo jizva po tříměsíční léčbě gelem **Strataderm®**.

Gel k léčbě jizev

Strataderm®